

LA ACCIÓN DE VIAGRA


5

MARZO
2018

VIAGRA INFORMATION

En este artículo, debe tomarse en cuenta una amplia gama acción de viagra de lectores del medicamento, que se anuncia en los medios: Sildenafil (Viagra). La gloria de una droga médica está creciendo todos los días, por lo que muchos hombres ya han experimentado su efecto sobre ellos mismos. Según las estadísticas no oficiales de los trabajadores de farmacia, la Viagra [...]

POSTED BY ADMIN



 You are here: \ Home \ [La acción de Viagra](#)

SEARCH ... 

En este artículo, debe tomarse en cuenta una amplia gama **acción de viagra** de lectores del medicamento, que se anuncia en los medios: **Sildenafil (Viagra)**. La gloria de una droga médica está creciendo todos los días, por lo que muchos hombres ya han experimentado su efecto sobre ellos mismos. Según las estadísticas no oficiales de los trabajadores de farmacia, la Viagra es una de las medicinas que se venden por mas por la noche.

La acción de Viagra

Este medicamento se usa en el tratamiento de la disfunción eréctil (impotencia). Su acción se basa en la relajación de la musculatura lisa, que posteriormente conduce a un flujo intenso de sangre hacia los cuerpos cavernosos del pene, lo que contribuye a una erección normal. Pero para que el efecto farmacológico se logre de la manera más adecuada, es necesaria la excitación sexual.

Desde el comienzo que se descubrió este medicamento, la acción del Viagra cabe señalar que fue creado para tratar a las personas con presión arterial alta. Pero los farmacéuticos no lograron el efecto deseado, debido a que el medicamento solo redujo ligeramente la presión arterial. Sin embargo, se encontró un efecto secundario inesperado en la forma de una mayor función eréctil en los hombres en los años 1998 y se disfruta por más de la mitad de los hombres en el mundo.

Indicaciones para el uso de Viagra

Viagra (**Sildenafil**): un medicamento para el tratamiento de la disfunción eréctil. Solo para curar una enfermedad, necesitas saber algo al respecto. Por lo tanto, hasta la fecha, los urólogos y andrólogos creen que una violación de la potencia (disfunción eréctil) es la incapacidad de lograr y mantener la erección del pene, necesaria para mantener relaciones sexuales. La razón de esto puede ser enfermedades endocrinas, medicamentosas, locales, neurológicas, vasculares. Las causas endocrinas de la disfunción eréctil se pueden atribuir a la producción inadecuada de hormonas sexuales masculinas o un tumor hipofisario.

Tales condiciones se manifiestan por la deposición de grasa «según el tipo de mujer» (en el pecho, las nalgas de las caderas), aumentando el timbre de la voz. Las causas del medicamento son causadas por el uso de los llamados «anti-andrógenos» (hormonas, bloqueando la acción de Viagra producción de hormonas sexuales masculinas) utilizado en tumores de próstata. Esto también incluye la influencia del alcohol y varias drogas que afectan la corteza cerebral, agotan todo el cuerpo como un todo.

Afortunadamente, la función eréctil se restablece tarde o temprano cuando se eliminan estos medicamentos. Las causas locales de la disfunción eréctil pueden ser todas las enfermedades que más tarde pueden conducir a la esclerosis de los cuerpos cavernosos del pene.

En este proceso, el tejido elástico que cubre los cuerpos cavernosos es reemplazado por el conectivo, y por lo tanto, el llenado de sangre de las estructuras del pene es difícil o muy doloroso. Causas más graves que conducen a la disfunción eréctil, naturaleza neurológica (epilepsia, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, trauma del cerebro, médula espinal, cirugía y trauma de los órganos pélvicos y el perineo). Las causas vasculares son una de las causas más comunes de esta patología. Con una erección normal de los genitales, el hombre está consiguiendo un flujo sanguíneo arterial más fuerte, pero el flujo venoso se ve obstaculizado de manera espectacular prácticamente inexistente. Por lo tanto, resulta que con el menor mal funcionamiento en este proceso, se altera el flujo de entrada de sangre o se produce una caída brusca a través de las venas.

Problemas similares surgen en la aterosclerosis de arterias grandes, endarteritis, aneurisma aórtico, venas varicosas. que a la menor falla en este proceso se altera el flujo de sangre o se produce una fuerte caída a través de las venas. Problemas similares surgen en la aterosclerosis de arterias grandes, endarteritis, aneurisma

aórtico, venas varicosas. que a la menor falla en este proceso se altera el flujo de sangre o se produce una fuerte caída a acción de viagra través de las venas. Problemas similares surgen en la aterosclerosis de arterias grandes, endarteritis, aneurisma aórtico, venas varicosas.

Pero la mayoría de las veces, los expertos todavía enfrentan la forma psicológica de la impotencia. Y teniendo en cuenta el hecho de que la mayor parte de la lista de causas orgánicas de la impotencia se acompañan de experiencias hombres emocionales, es evidente que las causas psicológicas están lejos de no poca importancia entre todos prichin. Ereksiya un hombre puede estar ausente, al instante desaparecer o ser muy mala calidad, si su depresión, la fatiga, el estrés prolongado, la mala salud, la insatisfacción consigo mismo, su segunda mitad, al pasar a las preferencias y necesidades sexuales de su pareja, etc. Con el temor de un posible embarazo, la aparición de una enfermedad que se transmite sexualmente. También, puede haber problemas con la erección si las relaciones sexuales se producen en circunstancias extremas (ascensor, encajando en la tienda,

Advierte a todos los lectores que el Viagra no es una panacea para tratar las causas antes mencionadas de la disfunción eréctil. Como regla general, cuando se trata la causa principal de la impotencia, el uso de Viagra no estará justificado.

Aplicación de Viagra

Una de las conocidas farmaceuticas más grandes de Estados Unidos, «Pfizer», produce Viagra. El medicamento se presenta en forma de una tableta azul en forma de diamante recubierta con una caparazón. Todas las tabletas vienen impresas con las inscripciones «VGR 25» «VGR 50» o «VGR 100» en uno de los lados de la píldora y «Pfizer» en la otra parte. El etiquetado digital indica la dosis del medicamento contenido en una tableta.

Como se escribió anteriormente para lograr el efecto de la droga, es necesaria la excitación sexual. Por lo tanto, para reducir las relaciones sexuales a la recepción automática de una píldora y a las relaciones sin alma simplemente no funciona. Por lo tanto, debe tener cuidado no solo acción de viagra de comprar un medicamento, sino también de organizar una velada romántica.

Se recomienda a las personas mayores de 18 años tomar el medicamento en una dosis de 50 mg. Tomar debe ser 1 hora antes de la supuesta relación sexual. La dosis es posible tanto para aumentar a 100 mg, como a 25 mg, dependiendo de la efectividad y la tolerancia a la dosis. La frecuencia de ingreso no debe exceder más de 1 vez por día, y la dosis es de 100 mg por recepción.

Cabe señalar que cuando se usa Viagra no se debe combinar con la ingesta de alimentos, porque el efecto esperado se desarrolla un poco más tarde.

Contraindicaciones de Viagra

Una gran ventaja es que Viagra se consigue en farmacias sin receta médica, lo que hace que el medicamento sea ampliamente disponible. Sin embargo, recomienda que antes de comenzar la aplicación del «medicamento milagroso» consulte a un médico, incluso puede ser examinado, para seleccionar una dosis, para analizar la frecuencia y la duración del medicamento.

Cuando lee el resumen del medicamento, pide atención especial a la composición del medicamento para garantizar la portabilidad de todos los componentes. Está estrictamente prohibido el uso conjunto de

medicamentos para el tratamiento de la angina de pecho (nitrito de amilo o nitratos), ya que el Viagra aumenta su efecto hipotensor.

No se deben administrar medicamentos para la corrección de la disfunción eréctil, incluido el Viagra, a los hombres para quienes la actividad sexual es indeseable (por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares, como angina inestable o acción de viagra insuficiencia cardíaca severa). Esta restricción se debe al hecho de que el fármaco tiene un efecto vasodilatador, el resultado de lo cual es una disminución leve y temporal de la presión sanguínea, lo que refuerza el efecto hipotensor de los nitratos orgánicos.

El medicamento debe usarse con precaución en los hombres con deformidades anatómicas del pene (angulación, fibrosis cavernosa o enfermedad de Peyronie) o pacientes con enfermedades que pueden causar priapismo (prolongado, erección dolorosa no asociadas con la excitación sexual), tales como mieloma múltiple, o leucemia, anemia drepanocítica.

Los efectos secundarios de Viagra

Después de una serie de estudios, se observaron los siguientes efectos secundarios:

- *Del sistema nervioso: dolor de cabeza, mareo del sistema.*
- *Desde el sistema cardiovascular: hiperemia de la piel, una sensación de latido cardíaco detrás del esternón.*
- *Desde el tracto gastrointestinal: trastornos digestivos.*
- *Desde el lado del órgano de la visión: una sensación de la nebulosa frente a los ojos, una mayor sensibilidad a la luz, una violación de la percepción de los colores.*
- *Desde el tracto respiratorio superior: congestión nasal.*

En relación con los posibles efectos secundarios, es necesario determinar la reacción individual de un hombre para tomar Viagra antes de conducir un vehículo o antes de trabajar con mecanismos potencialmente peligrosos.

Sobredosis de Viagra

Cuando suceda alguna sobredosis de la droga, puede causar todos los posibles efectos secundarios, pero en una forma más grave, que como regla general, requiere reanimación. La dificultad acción del viagra proviene en el hecho de que cualquier antídoto específico no es simple y cualquier método de purificación de la sangre (incluyendo la diálisis) son impotentes, porque el sildenafil ingrediente activo fuertemente unido a las proteínas plasmáticas y prácticamente elimina por la orina.

Entonces, a pesar de las propiedades milagrosas de Viagra, alienta a todos los hombres a prevenir el desarrollo de la disfunción eréctil. Para ello, debe llevar una vida sana, a abandonar los malos hábitos, si es posible consultar con un especialista antes de usar cualquier medicamento, mantener una vida sexual regular sin largos períodos de abstinencia y los extremos sexuales en el momento oportuno para el tratamiento de la enfermedad, la prevención de ejecución y las etapas crónicas. Cumpliendo con todas estas recomendaciones, no solo acción de viagra puede abandonar la píldora azul, sino también prolongar su vida sexual, entregándole alegría no solo a usted mismo sino también a su segunda mitad.

Latest News on Your Doctor's Blog



20

FEBRERO
2018

Lo que es Kamagra?

El medicamento Kamagra es uno de los primeros Viagra genéricos producidos en India. Este es un medicamento con un que es kamagra nombre de marca. Contiene sildenafil, se refiere a inhibidores de

[READ MORE](#)

POSTED BY ADMIN



20

FEBRERO
2018

Viagra: los Pros y Los Contras

Sildenafil (el medicamento original tiene el nombre comercial de Viagra) solo afecta los tabletas de viagra mecanismos naturales de la erección. Los científicos han desarrollado un nuevo medicamento

[READ MORE](#)

POSTED BY ADMIN



TADALAFIL (GENERIC CIALIS)

Tadalafil (Cialis) es el más nuevo y más potente de medicamentos para aumentar la potencia y el tratamiento de la disfunción eréctil en los hombres.



SILDENAFIL (GENERIC VIAGRA)

Sildenafil (Viagra) es el más popular y uno de los medicamentos más eficaces para aumentar la potencia de todo el mundo.



VARDENAFIL (GENERIC LEVITRA)

Levitra es el nombre de la marca de Vardenafilo, un nuevo fármaco para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina en forma de comprimidos.

[HOME](#)[TIENDA](#)[SILDENAFIL](#)[TADALAFIL](#)[VARDENAFIL](#)[KAMAGRA \(GENERIC VIAGRA\)](#)[BLOG](#)[CONTACTO](#)

© 2014 Copyright by AIT-Themes. All rights reserved.